


Impfpass-Check für Erwachsene



Wir
fürs **Impfen**

IMPFUNG	AB 18 JAHRE	Impfschutz aktuell?	AB 60 JAHRE	Impfschutz aktuell?
Tetanus	A (ggf. N) ^a	<input type="checkbox"/>	A (ggf. N) ^a	<input type="checkbox"/>
Diphtherie	A (ggf. N) ^a	<input type="checkbox"/>	A (ggf. N) ^a	<input type="checkbox"/>
Pertussis	A (ggf. N) ^a	<input type="checkbox"/>	A (ggf. N) ^a	<input type="checkbox"/>
Poliomyelitis	ggf. N	<input type="checkbox"/>	ggf. N	<input type="checkbox"/>
Pneumokokken	<i>Indikationsimpfung für Risikopatienten</i>	<input type="checkbox"/>	S ^c	<input type="checkbox"/>
Meningokokken C	<i>Indikationsimpfung für Risikopatienten</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Indikationsimpfung für Risikopatienten</i>	<input type="checkbox"/>
Masern	S ^b	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Influenza	<i>Indikationsimpfung für Risikopatienten</i>	<input type="checkbox"/>	S (jährlich)	<input type="checkbox"/>
FSME Frühsommer-Meningoenzephalitis	<i>Indikationsimpfung</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Indikationsimpfung</i>	<input type="checkbox"/>

Erläuterungen

A → Auffrischimpfung

S → Standardimpfung

N → Nachholimpfung
(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a → Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

b → Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff

c → Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff, ggf. Wiederholungsimpfungen im Abstand von mindestens 6 Jahren nach individueller Indikationsstellung