

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2020/2021

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten										Alter in Jahren						
		6	2	3	4	5 – 10	11 *	12	13 – 14	15	16 – 23	2 – 4	5 – 6	7 – 8	9 – 14	15 – 16	17	ab 18
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)															
Tetanus ^b	G1	G2	G3 ^c									A1	A2					A ^e
Diphtherie ^b	G1	G2	G3 ^c									A1	A2					A ^e
Pertussis ^b	G1	G2	G3 ^c									A1	A2					A3 ^e
Hib ^b	G1	G2	G3 ^c															
<i>H. influenzae</i> Typ b																		
Poliomyelitis ^b	G1	G2	G3 ^c															
Hepatitis B ^b	G1	G2	G3 ^c															
Pneumokokken ^b	G1	G2	G3 ^c														S ^g	
Meningokokken C			G1															
Masern			G1			G2											S ^f	
Mumps, Röteln			G1			G2												
Varizellen			G1			G2												
HPV Humanes Papillomviren																G1 ^d	G2 ^d	
Herpes zoster																		G1 ^h
Influenza																		S ⁱ (jährlich)

Empfohlener Impfzeitpunkt

Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen
 G Grundimmunisierung
 (in bis zu 3 Teilmimpfungen G1 – G3)
 A Aufrücksimpfung
 S Standardimpfung

a

Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
 b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate

d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich

e Td-Aufrücksimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
 f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unkarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
 g Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

h Aufrücksimpfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
 i Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden.